

Ваши дети готовы?

Требования закона о вакцинации шт. Миннесота

Требования к иммунизации

Используя приведенную схему, определите, какие прививки нужны для приема в детское дошкольное учреждение, программы для детей младшего возраста и в школы (государственные или частные).

Найдите возраст ребенка/класс и проверьте, получил ли ваш ребенок те прививки, которые указаны в отметке под каждой вакциной. Таблица на обратной стороне показывает возраст получения прививок.

От рождения до 4 лет Программы для детей младшего возраста и детские дошкольные учреждения	Возраст: От 5 до 6 лет ³ Для «нулевого» класса школы	Возраст: От 7 до 11 лет Для 1 - 6 классов	Возраст: От 12 лет и старше Для 7 - 12 классов
Гепатит А (Нер А) ✓			
Гепатит В (Нер В) ✓✓✓	Гепатит В ✓✓✓	Гепатит В ✓✓✓	Гепатит В ⁷ ✓✓✓
АКДС/ДС (DTaP/DT) ✓✓✓✓	АКДС/ДС (DTaP/DT) ⁴ ✓✓✓✓✓	✓✓✓ дозы, содержащие бактерии столбняка и дифтерии ⁶	✓КДС (Tdap) ⁸ & не менее 2-х доз, содержащих бактерии столбняка и дифтерии
Полиомиелит (Polio) ✓✓✓	Полиомиелит (Polio) ⁵ ✓✓✓✓	Полиомиелит (Polio) ✓✓✓	Полиомиелит (Polio) ✓✓✓
КПК (MMR) ✓	КПК (MMR) ✓✓	КПК (MMR) ✓✓	КПК (MMR) ✓✓
Гемофильная инфекция (Hib) ✓			Эпидемический менингит ✓ и ревакцинация ⁹
Пневмококковая инфекция ✓✓✓✓ ¹			
Ветряная оспа (varicella) ² ✓	Ветряная оспа (varicella) ² ✓✓	Ветряная оспа (varicella) ² ✓✓	Ветряная оспа (varicella) ✓✓

Рекомендуемая, но не обязательная вакцинация?

COVID-19

Для всех детей в возрасте 12 лет и старше

Грипп

Ежегодно для всех детей от 6 месяцев и старше

Ротавирус (Rotavirus)

Для грудных детей

Папилломавирус человека (Human papillomavirus)

В возрасте 11-12 лет

- ① Не требуется после 24 месяцев.
- ② Если ребенок уже переболел ветряной оспой, прививка от ветряной оспы не требуется. Если болезнь наступила после 2010 г., врач ребенка должен подписать форму, подтверждающую заболевание.
- ③ Ученики первого класса 6 лет и младше должны проходить вакцинацию от АКДС/ДС и полиомиелита по графику для «нулевого» класса.
- ④ Не нужно делать пятую прививку от АКДС, если четвертая была сделана в возрасте старше 4 лет. Последняя доза АКДС в возрасте 4 лет и старше.
- ⑤ Не нужно делать четвертую прививку от полиомиелита, если третья была сделана в возрасте старше 4 лет. Последняя доза от полиомиелита в возрасте 4 лет и старше.
- ⑥ Необходима справка о получении не менее 3-х доз, содержащих бактерии столбняка и дифтерии. Если все прививки серии АКДС/ДС были сделаны вовремя, дополнительные дозы не нужны.
- ⑦ Для детей в возрасте от 11 до 15 лет также можно применять альтернативную схему вакцинации от гепатита В из 2 прививок.
- ⑧ С 7 класса требуется одна доза КДС (Tdap). Также необходимо подтверждение вакцинации по крайней мере двумя дозами от столбняка и дифтерии (АКДС (DTaP)/АДС (DT)/АДСМ(Td)).
- ⑨ Одна доза вакцины требуется в начале учебного года для семиклассников. Повторная доза (ревакцинация) проводится в возрасте 16-ти лет.


Освобождения

Для того чтобы ребенок мог поступить в детское дошкольное учреждение, программы для детей младшего возраста или в школы в шт. Миннесота, необходимо предоставить подтверждение прохождения всей необходимой вакцинации или подать заявку на освобождение от прививок на законном основании.

Родители могут подать документ об освобождении по медицинским предписаниям, подписанный врачом, или об освобождении без медицинского предписания, подписанный родителем/опекуном и заверенный нотариально.

Когда проводится вакцинация, от рождения до 16 лет

(Календарь прививок, рекомендованный CDC)



ВАС БЕСПКОИТ СТОИМОСТЬ?
 Можно получить прививки бесплатно или со скидкой. Обратитесь к своему доктору или в свою клинику.

Еще не поздно! Если у вашего ребенка есть не все плановые прививки, обратитесь к своему врачу или в клинику, чтобы сделать недостающие прививки.

Закон Миннесоты требует письменного подтверждения некоторых прививок для детей, посещающих детские учреждения, программы для детей младшего возраста и школы. Однако, если у ребенка есть медицинская причина или если его родители возражают против одной или всех прививок, можно получить юридическое освобождение.

Детям с определенными заболеваниями могут потребоваться дополнительные прививки (например, пневмококковая или менингококковая). Обратитесь к своему врачу или в клинику.

Вы беременны? Защитите себя и своего ребенка от коклюша, сделайте прививку от АКДС между 27 и 36 неделями беременности. Обратитесь к своему врачу.

*количество доз зависит от препарата, которым пользуется ваш врач.
 ** Две дозы детям в возрасте от 9 до 14 лет; три дозы детям от 15 до 26 лет.

Копии карты прививок вашего ребенка вы сможете получить у своего врача. Дополнительные советы по поиску карты см. на сайте **Find My Immunization Record (Найти мою карту прививок)** (www.health.state.mn.us/people/immunize/mic/records.html) или позвоните в Информационный центр иммунизации штата Миннесота (МИС) по тел. 651-201-3980.

Объяснение сокращений вакцин

DTaP/Td/Tdap = дифтерия, коклюш, столбняк (АКДС/ДС/КДС)	Hib = гемофильский грипп типа b
Нер В = гепатит В	Нер А = гепатит А
MMR = корь, краснуха, паротит (КПК)	КПК (MMR)
	Ветряная оспа (varicella)
	Геп А (Нер А) (2 дозы не чаще 6 месяцев)
	Грипп (каждую осень)
	Геп В (Нер В) (2 дозы не чаще 6 месяцев)
	Ветряная оспа (Varicella) (12-15 месяцев)
	КПК (MMR) (12-15 месяцев)
	Полиомиелит (IPV) (6-18 месяцев)
	Пневмококковая инфекция (PCV) (12-15 месяцев)
	Гемофильная инфекция (Hib) (12-15 месяцев)
	АКДС (DTaP)
	Ротавирус (RV)*
	Геп В (Нер В)* (6-18 месяцев)
	АКДС (DTaP) (15-18 месяцев)
	Менингококковая конъюгатная вакцина (MCV)
	Менингококковая конъюгатная вакцина (MCV)
	НРВ** ВПЧ, вирус папилломы человека

